



Los **pacientes con hemofilia NO tienen un riesgo incrementado** de padecer la enfermedad o de presentar una forma más severa.

Recomendaciones generales

A. Pacientes con hemofilia que actualmente reciben tratamiento con concentrados de FVIII o de FIX recombinantes estándar o de vida media prolongada, CCPa, rFVIIa o emicizumab.

- No hay motivo para modificar el régimen de tratamiento recomendado.

B. Pacientes que reciben tratamiento con FVIII/FIX derivados de plasma.

- La inactivación viral y los procedimientos de eliminación utilizados en su fabricación son suficientes para destruir virus con envoltura lipídica como el SARS-CoV-2.1.
- No se recomienda cambiar de producto.

C. Todas las medidas para reducir la exposición a personas con COVID-19 deberían promoverse de manera proactiva entre todos los pacientes con comorbilidades (enfermedad cardiovascular, hipertensión, enfermedad pulmonar,

obesidad, diabetes, VIH, edad avanzada), o que reciban esteroides y otros fármacos potentes supresores del sistema inmunológico (tener en cuenta pacientes con inhibidor que recibieron recientemente o están recibiendo inmunosupresores como tratamiento de inmunotolerancia).

D. Minimizar la necesidad de visitar a profesionales de la salud en hospitales o consultorios.

La atención no urgente y las cirugías programadas deberían posponerse.

E. El paracetamol se recomienda como antipirético en lugar del ibuprofeno y otros AINEs.

F. En caso de admisión hospitalaria de un paciente con hemofilia infectado con COVID-19

- mantener buena comunicación entre el hospital al que ingresa el paciente y el hematólogo o centro tratante para manejo de la terapia de remplazo.
- informar al equipo si el paciente recibiera tratamiento con emicizumab (debido al riesgo de manejo inadecuado y de malinterpretación de los análisis de hemostasia por parte de profesionales de la salud no familiarizados con este fármaco).

Bibliografía

1. Consejo Asesor Médico de la FMH. Pandemia de COVID-19 (enfermedad del coronavirus 2019) causada por el virus SARS-CoV-2: Recomendaciones prácticas para pacientes con hemofilia. 21 marzo 2020. <https://news.wfh.org/es/pandemia-de-covid-19-enfermedad-del-coronavirus-2019-causada-por-el-virus-sars-cov-2-recomendaciones-practicas-para-pacientes-con-hemofilia-2/>
2. Plasma Proteins Therapy. New Coronavirus (SARS-CoV-2) and the Safety Margins of Plasma Protein Therapies. <https://www.pptaglobal.org/media-and-information/ppta-statements/1055-2019-novel-coronavirus-2019-ncov-and-plasma-protein-therapies>
3. Meissner and Rosenfield. Webinar: Covid-19 and Bleeding Disorders. 25 marzo 2020. www.youtube.com/watch?reload=9&v=aRdguUvbZpo&feature=youtu.be

