

# Leucemia linfática crónica (LLC) Subcomisión de LLC-SAH



HEMATOLOGÍA  
Volumen 24  
Número Extraordinario  
COVID-19: Abril 2020

Los pacientes con LLC, ya sean tratados o no, tienen inmunodepresión, por ende, un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID19, pero quizás haya un riesgo menor para la LLC que para aquéllos con afecciones cardíacas o pulmonares.

## Recomendaciones generales

- Sugerimos en aquellos pacientes sintomáticos que requiera imperiosamente tratamiento no administrar quimioinmunoterapia, sí la utilización de inhibidores BTK, ibrutinib.
- En aquéllos que están bajo tratamiento con ibrutinib se recomienda no suspenderlo.
- No hay datos científicos disponibles sobre prevención primaria profiláctica de infecciones con gammaglobulina endovenosa o subcutánea en pacientes inmunocomprometidos o inmunocompetentes en el contexto de esta pandemia por COVID 19.
- Sí sugerimos continuar en aquellos pacientes con LLC, con hipogammaglobulinemia < 400 mg/dL e historia de infecciones que requieran antibióticos, con las infusiones profilácticas de gammaglobulina endovenosa o subcutánea.
- Se recomienda la administración de la vacuna antigripal y antineumocócica.

## Bibliografía

1. ASH: COVID-19 and Indolent Lymphomas: Frequently Asked Questions. Experts: Ranjana Advani,

Nancy Bartlett, Leo Gordon, Peter Johnson, Kerry Savage, Laurie Sehn, Jane Winter.



**Atribución – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa):** No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Esta licencia no es una licencia libre.