

Introducción

Dr. David Luis Xavier



**SUPLEMENTO DE
LA REVISTA DE
LA SOCIEDAD
ARGENTINA DE
HEMATOLOGIA**

*Servicio de Hematología. Hospital de Clínica. UBA
e-mail: xavierhematol@yahoo.com.ar*

HEMATOLOGIA, Suplemento I: 1
Diciembre, 2006

El uso racional de la tromboprolifaxis está basado en principios sólidos y evidencias científicas; por lo tanto la prevención es esencial para reducir la mortalidad y la morbilidad causada por la Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETV).

Este suplemento resume los temas de la Reunión Científica de la SAH realizada el 27 de mayo del 2005.

En primer lugar se evaluaron los conceptos generales, de donde surge la alta incidencia de la ETV, sobre todo en los pacientes hospitalizados que tienen uno o varios factores de riesgo y que generalmente son acumulativos. También veremos la mayor incidencia de estos trastornos en la población con cáncer.

La incidencia de Trombosis Venosa Profunda (TVP) en los pacientes hospitalizados sin profilaxis

demostrada en forma objetiva, en situaciones médicas o en cirugía general es del 10 al 40%, llegando hasta 40%-60% en cirugía ortopédica. Aproximadamente el 10% de las muertes en pacientes hospitalizados son secundarias a Embolia de Pulmón.

Estos y otros datos hablan de la gran importancia y vigencia que tiene la ETV.

En este suplemento se realiza una extensa revisión de la mayoría de las situaciones clínicas y quirúrgicas, así como también temas particulares como por ejemplo: la prevención en los viajes prolongados, en pacientes con cuadros clínicos y quirúrgicos críticos, en el embarazo y en los casos pediátricos.

En esta revisión tiene un enfoque actualizado y práctico, dado que disponemos de medidas profilácticas eficaces y seguras para la mayoría de los pacientes de acuerdo a su riesgo.