


Linfangiomatosis Esplénica Difusa

N. Emery; G.R. Stemmelin; M. Ceballos; A. Iotti; R. Cerutti;
C. Shanley; J. Ceresetto; O. Rabinovich; E.O. Bullorsky

Hospital Británico de Buenos Aires

La esplenomegalia aislada sin etiología evidente es usualmente derivada a la consulta hematológica. Presentamos imágenes pertenecientes a una paciente de 57 años, asintomática y con análisis sanguíneos de rutina normales. Una Tc de abdomen evidenciaba esplenomegalia heterogénea con múltiples zonas hipodensas. La esplenomegalia laparoscópica reveló un bazo macronodular de 16.5 cm x 10.2 cm x 4.5 cm. Al corte se observaban numerosas cavidades quísticas y el examen microscópico mostraba espacios linfáticos muy dilatados, revestidos por endotelio plano y contenido de material proteináceo amorfo y eosinófilo. Se diagnosticó linfangiomatosis esplénica difusa (LED). La LED es una patología muy infrecuente que debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de esplenomegalia.



**IMÁGENES EN
HEMATOLOGÍA**

HEMATOLOGIA, Vol. 8 N° 1: VII
Enero-Abril, 2004

